



**Condiciones meteorológicas:** Cielo algo tapado, sin riesgo de lluvia con buenas condiciones de luz.

### Descripción:

Incluir aquí: 1) Todas las **circunstancias de interés** que concurren en la observación (relato de cómo se encontró, circunstancias meteorológicas de interés, aves acompañantes...) y 2) Una **descripción detallada del ave** o aves registradas, preferiblemente incluyendo los siguientes puntos: a) estructura (tamaño, proporciones, especies con las que se compara directamente), b) partes no emplumadas (pico, ojo, patas, diseño y colorido) c) partes emplumadas (partes inferiores, partes superiores, cabeza, alas, cola –si puede ser, detallando los grupos de plumas: coberteras, primarias, secundarias y terciarias-, d) comportamiento: actitudes en tierra o en vuelo, relaciones con otras aves, etc..., e) voz y/o canto, f) una discusión de por qué cree el observador que se trata de esa especie y no otra. Incluir comentario sobre posible origen natural o no del ejemplar, si procede. Esta descripción debe basarse en las notas tomadas durante la observación, no en libros de referencia. Conviene adjuntar notas de campo originales o sus fotocopias, así como dibujos, aunque sean sencillos. En caso necesario pueden utilizarse más hojas.

#### INTRODUCCION:

Durante la ejecución del Censo Quincenal que se lleva a cabo en la reserva Natural del Remolar, delta del Llobregat, y más concretamente en el 2º punto de observación perteneciente al tramo que incluye el camino de la Vidala y la cuadra, me dispongo a censar un pequeño espacio de limo en medio de una junquera de la marisma. Tras levantar los primeros limícolas que me van saliendo al paso (Chorlitejo chico, Chorlitejo Grande, Andarríos Bastardo), se levanta a unos 2 metros de mis pies otro limícola que a primer golpe de vista identifico como Gallinago sp. El ave en cuestión levanta el vuelo (no más de 3 metros del suelo) y tuerce a mi lado izquierdo para situarse de nuevo sobre otra zona encharcada a unos 30 metros de mi posición. Siendo consciente que ya es algo tarde para observar Gallinago gallinago, presto atención a las características de identificación de Gallinago media (coloración de las rectrices externas de la cola, tamaño en general, coloración de las partes inferiores (barriga, flancos, etc..) y tipo de vuelo.

#### ESTRUCTURA:

Una de las primeras impresiones que me hicieron pensar en Gallinago media fue la estructura del ave. De forma más rechoncha que G.gallinago, sobre todo con una barriga algo más gruesa que le daba un aspecto más gorda al ave. Quizás por el motivo de su tamaño, comparándolo con G.gallinago, mantengo la impresión de que sus alas eran más anchas.

#### PARTES NO PLUMADAS:

En las 5 veces que se pudo hacer levantar el vuelo al ave, pude observar o más bien comparar la longitud de su pico con G. gallinago, llegando a la conclusión de que era ligeramente algo más corto y robusto, aunque soy consciente de la variabilidad de longitud que sufre G. gallinago y que yo mismo he podido comprobar. No pude conseguir observar sus patas ya que nunca se consiguió observar al ave posada pero si era posible ver que durante el vuelo sobresalía una pequeña parte tras la cola.

#### PARTES PLUMADAS:

Cola corta con coloración central de color pardo rojizo con moteado más oscuro. Destacando de forma muy clara la coloración blanca de sus rectrices externas. Esta característica se la pude observar en 4 o 5 ocasiones cuando iba tras el ave con intención de observarla posada (cosa imposible), justo cuando cada vez alzaba el vuelo.

Partes inferiores oscuras sin ningún claro sin moteado a diferencia de G. gallinago. En un par de ocasiones, cuando el ave volaba entre 2 y 3 metros de altura y con vuelo horizontal pude observarle el moteado de sus flancos muy marcados y que cubría todas las partes laterales y barriga al completo. Cabe destacar las 4 rallas típicas del género Gallinago en la zona escapular que destacaba sobre un fondo casi negro, de intensidad y grosor más parecido a G.gallinago que a *Lymnocyptes minimus*.

El diseño del ala por la parte superior destacaba de forma notable unas finas líneas blancas (borde de Cobertoras Grandes, Cobertoras Primarias y Cobertoras Medianas) que se extendían de la parte más interna del ala hasta recorrer todo el ala. Este rasgo se hacía bastante visible cada vez

que el ave alzaba el vuelo debido a un contraste muy visible con la coloración muy oscura del resto del ala.

#### COMPORTAMIENTO Y FORMA DE VUELO:

El comportamiento del ave era bastante similar a G.gallinago con las siguientes diferencias: cada vez que volvía a alzar el vuelo se posaba a una distancia, aunque dando algún rodeo, no superior a los 20 o 30 metros cosa que en G. gallinago es normal ver desaparecer el ave tras ser levantada. Otra característica, no se si diferenciable pero si almenos curiosa, es que el ave siempre volvía al lugar de inicio, o sea, que tras levantarse e ir a otro lugar, al cabo de pocos minutos volvía practicamente al metro cuadrado de limo, facilitando así su reencuentro (cosa que Rafa Armada puede agradecer! y que de la misma forma se pudo por fin fotografiar el ave). Otro rasgo muy distintivo a la hora de separar de G. gallinago es su forma de vuelo. Se trataba de un vuelo que recordaba mas a una Chocha perdiz (*Scolopax rusticola*) que a G.gallinago. Vuelo potente pero no tan irregular como G.gallinago, sin llegar a hacer tantos "queiebros" en el aire. El batir de las alas no era tan rápido y en general era un vuelo mas pausado y tranquilo.

#### VOCES:

Aún teniendo presente su reclamo (tras haberlo escuchado en varias ocasiones en una anterior cita creo que hará 2 años en el mismo delta del Llobregat) no llegó a emitir ningún sonido.

**Por último, ¿considera totalmente segura esta cita?:**

¿Alguna persona no se halla de acuerdo?:

Autor de la descripción: , 06/06/02

**Empaquete con cuidado fotos o diapositivas.** Conserve copias a ser posible.