

OBSERVACIONES DE AVES RARAS EN ESPAÑA, AÑO 1998

Eduardo DE JUANA A.*
y el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología

(*Departamento de Biología Animal I. Facultad de Biología, 9ª planta.
Universidad Complutense. E-28040 Madrid.)

RESUMEN.- *Observaciones de aves raras en España, año 1998.* Informe número 15 del Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología. Presenta 163 registros nuevos correspondientes a 82 especies, con un porcentaje de aceptación del 74,2 %. Entre las citas más relevantes incluye las primeras para el conjunto de España de Coliazul Cejiblanco *Tarsiger cyanurus* y Alcaudón Isabel *Lanius isabellinus*, y las primeras para las islas Canarias de Gaviota Pipizcan *Larus pipixcan* y Tórtola Senegalesa *Streptopelia senegalensis* (aves de origen desconocido). También presenta las primeras citas homologadas de Suirirí Bicolor *Dendrocygna bicolor* (ejemplar de origen desconocido), Ganso Chico *Anser erythropus* (tres citas), Águila Pomerana *Aquila pomarina* (observación en Baleares) y Búho Moro *Asio capensis* (única cita europea en el siglo XX), así como las segundas homologadas de Avetoro Lentiginoso *Botaurus lentiginosus* y Alondra Ibis *Alaemon aludipes* (ésta en Canarias).

SUMMARY.- *Report on rare birds in Spain in 1998.* This is the 15th annual report of the Spanish Ornithological Society's Rarities Committee. It presents 163 new records relating to 82 species, with an acceptance rate of 74,2 %. Species new to the Spanish list are Red-flanked Bluetail *Tarsiger cyanurus* and Isabelline Shrike *Lanius isabellinus*, and for the Canary islands list, Franklin's Gull *Larus pipixcan* and Laughing Dove *Streptopelia senegalensis* (birds of unknown origin). Species already cited in the literature for Spain but having here their first formally accepted records are Fulvous Whistling Duck *Dendrocygna bicolor* (bird of unknown origin), Lesser White-fronted Goose *Anser erythropus* (three records), Lesser Spotted Eagle *Aquila pomarina* (recorded in the Balearics) and Marsh Owl *Asio capensis* (XXth century only European record). Second accepted records are given for American Bittern *Botaurus lentiginosus* and Hoopoe Lark *Alaemon aludipes* (observation made in the Canary islands).

INTRODUCCIÓN

Con éste, son quince ya los años en que de forma ininterrumpida el Comité de Rarezas que auspicia la Sociedad Española de Ornitología comparece con su informe anual de actividades. En esta ocasión trata 163 registros de aves raras en España, más algunos publicados en anteriores informes que vuelven a comentarse por incluir fechas de 1998. Cierta retraso en el trabajo del Comité en los últimos meses, que lamentamos sinceramente, hace que aún haya cierto número de citas de 1998 por evaluar y que aparecerán, previsiblemente, en el siguiente informe. Se tratan en total 82 especies, de las que 67 cuentan con algún registro homologado. Las 121 citas homologadas en total suponen un porcentaje de aceptación del 74,2 %, algo inferior al de años previos que solía situarse en torno al 85 %.

En este informe se incluyen, entre las citas más relevantes, dos que por primera vez señalan sendas especies en el territorio español, las referentes al Coliazul Cejiblanco *Tarsiger cyanurus* (ejemplar anillado en Barcelona) y al Alcaudón Isabel *Lanius isabellinus* (con dos observaciones, una gallega y otra balear). Para otras especies citadas con anterioridad en España se presentan los primeros registros homologados, en concreto para el Suirirí Bicolor *Dendrocygna bicolor* (un ejemplar que podría proceder de cautividad), el Ganso Chico *Anser erythropus* (tres citas), el Águila Pomerana *Aquila pomarina* (un ave inmadura observada en Menorca, Baleares) y el Búho Moro *Asio capensis* (un ave herida por arma de fuego en la bahía de Cádiz que constituye la única cita europea en todo el siglo XX). También merecen mención especial las segundas citas homologadas del Avetoro Lentiginoso *Botaurus lentiginosus* y la Alondra Ibis *Alaemon aludipes*, esta última en Canarias, al igual que la tercera de la Terrera Colinegra *Ammomanes cincturus* –también de Canarias– y la tercera y la cuarta del Carricero Agrícola *Acrocephalus agricola*. Con relación a las Canarias cabe señalar, por último, las primeras citas de Gaviota Pipizcan *Larus pipixcan* y Tórtola Senegalesa *Streptopelia senegalensis* (aves de origen dudoso).

Tampoco este año han cambiado los integrantes del Comité, con David Bigas i Campas (Deltebre, Tarragona), José Ignacio Dies Jambrino (Valencia), Elías García Sánchez (Oviedo/Uvieu), Ricard Gutiérrez Benítez (Barcelona), Juan Antonio Lorenzo Gutiérrez (La Laguna, Tenerife) y José Luis Rabuñal Patiño (A Coruña), ni su Secretario, Eduardo de Juana Aranzana. Sí se ha podido contar, gracias al apoyo de SEO/BirdLife, con la eficaz y estimulante ayuda en las labores de secretaría de Rosa M. Ayala Monedero.

Nuestro sincero agradecimiento, un año más, a todos los observadores que han tenido a bien someter sus registros a evaluación, en la esperanza de que continúen colaborando en el futuro, y a todos cuantos de un modo u otro han apoyado la labor del Comité.

LISTA SISTEMÁTICA DE REGISTROS HOMOLOGADOS

La lista que sigue se ha elaborado de acuerdo con los siguientes criterios:

- En cada observación se consignan, por orden, 1) provincia; 2) localidad; 3) número de aves observadas (si no se indica otra cosa es una sola), 4) edad y sexo si se conocen (para datos primaverales-estivales sólo se expresa edad cuando no se trata de plumaje nupcial); 5) indicaciones en el caso de que el ave o aves hubieran sido cazadas, trampeadas o encontradas muertas, y si se conservan y dónde; asimismo, si existen fotografías entre la documentación en poder del Comité; 6) fecha(s); 7) observador(es), en general no más de tres.

- Se publican sólo datos considerados seguros, aunque también observaciones indeterminables a nivel específico en géneros de gran dificultad como *Diomedea* (albatros) o *Limnodromus* (agujetas).

- Las cifras entre paréntesis dispuestas a continuación del nombre de la especie indican los registros/individuos homologados ya por el Comité para los conjuntos de España peninsular-islas Baleares (PB) y Canarias (C) en: 1) años anteriores a 1998; 2) año 1998 (sin incluir los registros de 1997-1998 que ya aparecieron en el informe de 1997).

- De no mediar indicación en otro sentido las fechas se refieren todas al año 1998.

- La secuencia taxonómica seguida es, salvo pequeñas modificaciones, la de Voous (*The List of Birds of the Western Palearctic*, 1978).

- Un breve comentario sobre cada especie intenta situar las observaciones consideradas en relación a lo que se conoce sobre el estatus de la especie en España y a lo ya dicho en informes anteriores, indicando al principio, entre paréntesis, lo esencial del área de cría en el mundo.

La propiedad de los datos contenidos en el informe corresponde a los diferentes observadores, quienes deberán ser citados como autores en la bibliografía.

1) ESPECIES QUE SE CONSIDERAN RAREZAS EN EL CONJUNTO DE ESPAÑA

Zampullín Cuellirrojo

Podiceps auritus (PB: 40/64, 1/1)

Asturias. Ría de Villaviciosa, 8 a 25 de enero (G. Gil Madrera y A. González Losa).

(Holártico boreal). Localidad y fecha dentro de lo esperable. Parece ser que este invierno se llegaron a ver hasta seis aves en Santoña.

Pelicano Común

Pelecanus onocrotalus (PB: 8/8, 1/3)

Huelva. Palos de la Frontera, Estero de Domingo Rubio, tres ads., 15 de septiembre (por referencias hasta cinco aves, desde el 29 de agosto) (I. García Páez, B. López Soler y A. Serrano Lavado).

1997:

Lleida. Embalse de Cellers, ad., hay fotografías, 1 de marzo (al parecer desde días antes) (J. Castelló).

(Europa sudoriental, Asia y África). **Origen desconocido.** La de Huelva es la primera observación homologada que hace referencia a más de un individuo.

Pelicano Rosado

Pelecanus rufescens (PB: 5/2, 1/1)

Baleares. Isla de Mallorca, Salobrar de Campos, salinas, 5 de diciembre (A. Stagg).

(África al sur del Sahara). **Origen desconocido.** Primera observación en Baleares.

Rabijunco Etéreo

Phaethon aethereus (C: 5/6, 1/1)

Las Palmas. Isla de Fuerteventura, Puerto del Rosario, ad., 29 de mayo (C.-J. Palacios).

1994:

Las Palmas. “Ferry” entre las islas de Fuerteventura y Lanzarote, hay fotografía, 6 de agosto (G. Spanoghe y B. de Muilentrekker).

(Atlántico, Índico y Pacífico, en latitudes tropicales). Las seis citas hasta ahora homologadas, todas canarias, caen entre finales de abril y principios de agosto. El Comité Português de Raridades ha homologado recientemente el primer registro para Madeira: un ave unas 50 millas al suroeste de las Desertas el 22 de julio de 1997 (Costa *et al.*, en prensa).

Avetoro Lentiginoso

Botaurus lentiginosus (PB: 1/1, 1/1)

A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, ensenada de la Insua, 10 de octubre (J.L. Rabuñal Patiño).

(Norteamérica). La anterior observación homologada –del mismo observador que la actual- se produjo en la cercana laguna de Traba, Laxe, en octubre de 1982 (*Ardeola*, 35: 169). Mitchell & Young (1997) recopilan un mínimo de 74 registros en Europa, la mayoría de Gran Bretaña (38) e Irlanda (22) donde las llegadas tienen lugar habitualmente entre septiembre y diciembre (Dymond *et al.*, 1989).

Marabú Africano

Leptoptilos crumeniferus (PB: 6/6, 0/0)

1997:

Ciudad Real. Tablas de Daimiel, hay grabación en vídeo, 6 de noviembre (según referencias desde un par de semanas antes) (D. González).

(África al sur del Sahara). **Origen desconocido.**

Ibis Sagrado

Threskiornis aethiopicus (PB: 3/3, 1/2; C: 1/1, 0/0)

Tarragona. Delta del Ebro, arrozales entre Sant Carles de la Rápita y Poble Nou, dos –ad. y 1er. inv.-, hay fotografías, 28 y 30 de diciembre (parece que las dos aves se quedaron hasta febrero de 1999 y la adulta hasta abril) (J. Robres Cabezón y D. Benavides Madariaga).

1994-1995:

Toledo. Ampliación de fechas: el inm. fotografiado en el embalse de Castrejón en febrero y junio de 1995 (*Ardeola*, 44: 121) se detectó ya el 8 de diciembre de 1994 (T. Velasco, A. Acha, J.F. Layna y E. Soto-Largo).

(África subsahariana y Madagascar). **Origen desconocido.** Parece ser que la especie cría en libertad en el zoo de Barcelona (D. Bigas, com. pers.). Con relación a la población asilvestrada en Francia, en 1998 una pareja ha criado en Charente-Maritime (hasta el momento sólo se conocía la colonia del lago Grand Lieu, Bretaña) (*British Birds*, 92: 66).

Suirirí Bicolor*Dendrocygna bicolor* (PB: 0/0, 1/1)

Málaga. Laguna de Fuentedepiedra, hay fotografías, al menos los días 14 de mayo (T. Gullick) 27 de junio y 2 de julio (F. Chiclana Moreno, J. Salcedo Ortiz y J.M. Santos Madrid).

(África al sur del Sahara, sur de Asia y América). **Origen desconocido.**

Primer registro homologado para España y la península Ibérica donde sólo se conoce una cita previa, correspondiente a una hembra cazada en las marismas del Guadalquivir en septiembre de 1971 (Castroviejo, 1972). Al ser un ave muy común en cautividad no es posible pronunciarse a favor de una llegada natural, al igual que ocurre con citas similares del sur de Francia (Dubois & Yésou, 1991). Sin embargo, cabe recordar que el Suirirí Bicolor parece haber alcanzado esporádicamente Marruecos, con observaciones que incluyen un bando de una docena de aves en el río Massa (Snow & Perrins, 1998).

Cisne Vulgar*Cygnus olor* (PB: 10/27, 4/6)

A Coruña. Valdoviño, laguna de A Frouxeira, tres –al menos dos ads.-, hay fotografía, 23 de septiembre a 29 de octubre (las tres aves sólo el 13 de octubre) (P. Gutiérrez Varga y otros/Sterna-Ferrol).

Madrid. Embalse de Valmayor, subad., 15 de noviembre (J.L. Muddeman, R.E. Simpson y L. Herrera-Álvarez).

Pontevedra. Ría de Vigo, ensenada de San Simón, ad., 10 de enero a 13 de marzo (C. Vidal Rodríguez, A. Gil Carrera y R. Salvadores Ramos); ría de Vigo, Vilaboa, juv., 7 de febrero (F.J. Torres Goberna y A. Durán Besada).

(Europa y Asia, en latitudes medias). **Origen desconocido.** Es bastante probable que todas estas aves tengan que ver con sueltas o escapes.

Ánsar Piquicorto*Anser brachyrhynchus* (PB: 13/16, 2/4)

A Coruña. Ría de Ortigueira, las tres aves observadas de diciembre de 1997 a febrero de 1998 (*Ardeola*, 46: 132) se siguen viendo hasta el 22 de marzo (J.M. Alonso Pumar y R. Hevia Barcón).

Palencia. Fuentes de Nava, laguna de La Nava, 15 y 19 de enero (E. Gómez Crespo, GESNATUR/Junta de Castilla y León).

1997:

Palencia. Fuentes de Nava, laguna de La Nava, 20 de febrero (E. Gómez Crespo y M. Barbero).

1994:

A Coruña. Cariño, pastizales en Vixía da Herbeira, ad., 15 y 16 de noviembre (J.M. Alonso Pumar y R. Hevia Barcón).

(Groenlandia, Islandia y Spitsbergen). La última fecha de la observación de A Coruña, un 22 de marzo, es la más tardía hasta ahora para la especie en España.

Ánsar Chico*Anser erythropus* (PB: 1/1, 2/2)

Palencia. Fuentes de Nava, laguna de La Nava, ad., 25 y 26 de febrero (E. Gómez Crespo, GESNATUR/Junta de Castilla y León); Boada de Campos, laguna, ad., 23 de diciembre (E. Gómez Crespo y F.J. Urcalegui).

1997:

Baleares. Isla de Menorca, Es Mercadal, humedal de Lluriach-Tirant, hay fotografías, 2 a 31 de marzo (D. Coll, T. Pons y S. Catchot).

(Paleártico boreal, desde el norte de Escandinavia). Estas son las tres primeras citas que homologamos, aunque en España el Ánsar Chico ya ha sido señalado alguna que otra vez (Irby, 1895; Bernis, 1966; Hidalgo & Rodríguez, 1972; García *et al.*, 1989; Llandres & Urdiales, 1990; Persson, 1995). Antes relativamente común en Escandinavia, sufrió un dramático declive que se ha tratado de compensar mediante una serie de programas de reintroducción (Tucker & Heath, 1994) gracias a los cuales una población de unas 50 aves invertebra, desde 1994, en los Países Bajos (van den Berg & Bosman, 1999). La especie se considera accidental tanto en Francia (Dubois & Yésou, 1991) como en las islas Británicas (Dymond *et al.*, 1989), países donde prácticamente todos los datos caen entre noviembre y marzo.

Ánsar Indio

Anser indicus (PB: 9/13, 2/2)

Palencia. Fuentes de Nava, laguna de La Nava, ad., 16 de diciembre (E. Gómez Crespo, GESNATUR/Junta de Castilla y León) y probablemente el mismo en la cercana laguna de Boada de Campos el día 23 del mismo mes (E. Gómez Crespo y F.J. Urcalegui) y otra vez en la laguna de La Nava el día 27 (G. Parra Muñoz).

Toledo. Embalse de Navalcán, ad., 18 de diciembre (J.F. Fernández Baltanás).

(Asia central). **Origen desconocido.** Primeras citas homologadas fuera de Villafáfila o las Marismas.

Ánsar Nival

Anser caerulescens (PB: 9/11, 0/0)

1997:

Tarragona. Delta del Ebro, isla de Buda, dos ads., hay fotografías, 24 de septiembre a 5 de diciembre (A. Martínez-Vilalta, M. Cebolla y R. Tomàs).

(Norteamérica). **Origen desconocido.** Es la primera observación en España que hace referencia a más de un ave. Parece probable que estas mismas aves fueran las que se detectaron posteriormente en la Camarga francesa entre el 8 de diciembre de 1997 y el 4 de febrero de 1998 (*Ornithos*, 5: 176).

Barnacla Canadiense

Branta canadensis (PB: 4/4, 1/1)

Zamora. Villafáfila, hay fotografías, 28 de noviembre a 20 de diciembre (M.A. García Matellanes y A. Rodrigo García; O. de Dios Ruiz y K. de Dios Ruiz; M.J. Sánchez Rodríguez, F. Acera Martín y L. Ferreira Redondo).

(Norteamérica, introducido en las islas Británicas y Escandinavia). **Origen desconocido.**

Ganso del Nilo

Alopochen aegyptiacus (PB: 4/7, 1/2)

Madrid. Manzanares el Real, embalse de Santillana, dos, 3 de octubre (J. Ruiz Rodrigo, F.J. Martínez de Aramallona y P. Tapia Porras) y una sola ave del 24 al 26 de agosto (E.L. García de la Morena) y el 8 de noviembre (D. Díaz Díaz).

1997:

Madrid. San Lorenzo del Escorial, dos, se examinó una fotografía que fue posteriormente extraviada, 24 de enero (I. Rodríguez Prieto).

(África subsahariana y Egipto, introducido en Gran Bretaña y los Países Bajos). **Origen desconocido.**

Tarro Canelo

Tadorna ferruginea (PB: 34/74, 7/15; C: 2/8, 1/20)

Baleares. Isla de Mallorca, parque natural de s'Albufera, macho, 30 de marzo (A. Stagg) y quizás el mismo en las salinas de Salobrar de Campos a lo largo del mes de abril, al menos hasta el 29 (D. Wellings); más tarde, en s'Albufera (depuradora de lagunaje) se observa un ave el 26 de julio y ocho los días 27 y 28 de agosto (B. Ramis y M. Rebassa) así como, en Salobrar de Campos, siete el 25 de octubre que pudieran ser parte de las anteriores (V. Heredero Varnam).

Cáceres. Monroy, 3 de abril (R.P. Tipper, K. Phillipps y K.C. Searle).

Las Palmas. Isla de Fuerteventura, diversas localidades, al menos dos parejas reproductoras, una en Rosa de Catalina García (observada con nueve pollos de un par de días de edad el 24 de marzo) y la otra en el barranco de La Torre (con siete pollos de 2-3 días el 29 de marzo) que más tarde se reúnen en el embalse de Los Molinos (el 10 de junio se anotan aquí, en total, cuatro adultos y siete jóvenes); en Los Molinos hay numerosas observaciones de aves diferentes desde septiembre de 1997 hasta diciembre de 1998, siendo lugares próximos de observación ocasional Gran Tarajal y Tiscamanita (en este último lugar el 10 de enero se recoge un macho inmaduro herido por choque contra tendido eléctrico; hay fotografía) (C.-J. Palacios).

Madrid. El Pardo, embalse, dos, entre 24 de agosto de 1997 y 7 de febrero de 1998, quizás todavía el 25 de octubre (F.J. Ortega Pinilla).

Málaga. Málaga, desembocadura del Guadalhorce, hay fotografía, desde 16 de diciembre de 1997 hasta, al menos, julio de 1998 (A.M. Pérez Ortigosa, A. Mariscal y otros).

Navarra. Zolina, balsa de Zolina, 26 de septiembre (G. Gorospe Rombouts).

Zamora. Villafáfila, laguna de Salina Grande, probable hembra, 7 de diciembre (A. Balmori Martínez y M.A. Cuesta Ruiz-Colmenares) y quizás la misma el 7 de marzo de 1999 (J.J. Ramos Encalado y otros).

1997:

Las Palmas. Isla de Fuerteventura, véase arriba.

Madrid. El Pardo, véase arriba.

Málaga. Málaga, véase arriba.

(Asia centro-occidental, con pequeñas áreas en sureste de Europa y noroeste de África). Parece consolidarse la reproducción en Fuerteventura y siguen en aumento las citas peninsulares, éstas de **origen desconocido**. Una interesante revisión sobre la situación de la especie en las islas Británicas y el resto de Europa puede consultarse en Vinicombe & Harrop (1999).

Pato Mandarin*Aix galericulata* (PB: 11/29, 2/2)

A Coruña. Laxe, laguna de Traba, macho, desde 15 de noviembre de 1997 hasta, al menos, 17 de enero de 1999 (dos observaciones anteriores, una en la misma laguna de Traba el 13 de octubre y otra en la cercana ensenada de la Insua el 1 de noviembre, pudieran corresponder a este mismo individuo pero también a otras aves) (J.L. Rabuñal Patiño).

Barcelona. Delta del Llobregat, laguna de El Remolar, macho ad., 19 de noviembre (R. Gutiérrez Benítez, F.X. Santaefemia, F. López Sanz y otros).

1997:**A Coruña.** Véase arriba.(Paleártico oriental, introducido en Gran Bretaña). **Origen desconocido.**

Larga permanencia de un macho en Galicia.

Silbón Americano*Anas americana* (PB: 4/4, 3/3; C: 3/9, 0/0)

A Coruña. Ponteceso/Cabana de Bergantiños, ensenada de la Insua, hembra, 20 de diciembre de 1997 a 8 de febrero (J.L. Rabuñal Patiño); macho ad. en eclipse, 28 de septiembre y 4 de octubre (J.L. Rabuñal Patiño).

Palencia. Fuentes de Nava, laguna de La Nava, macho, 12 a 20 de marzo (E. Gómez Crespo, GESNATUR/Junta de Castilla y León).

1997:**A Coruña.** Véase arriba.

(Norteamérica). Dos nuevas citas coruñesas –y ya van cinco- junto a la primera para la Meseta Norte. El año 1998 fue bueno de anátidas norteamericanas, tanto aquí como –con cifras mucho mayores por supuesto- en Gran Bretaña (Rogers *et al.*, 1999).

Cerceta Común*Anas crecca* (PB: 8/6, 2/2; C: 3/3, 1/1)Aves con caracteres de la subespecie *Anas crecca carolinensis*:

A Coruña. Valdoviño, laguna de A Frouxeira, macho, 15 de marzo (A. Gutiérrez Pita, P. Gutiérrez Varga, P. Pita Criado y A. López Vázquez / Sterna-Ferrol).

Lugo. Laguna de Cospeito, macho, 1 de enero (L.J. Salaverri Leiras).

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, La Laguna, balsa entre Tejina y Bajamar, macho, 12 de febrero (quizás ya desde el 17 de enero) (D. Trujillo González).

(Norteamérica). Cuarto invierno consecutivo en Cospeito, donde el año anterior se vieron dos machos juntos.

Ánade Sombrío*Anas rubripes* (PB: 3/2, 1/1; C: 1/1, 0/0)

Lugo. Laguna de Cospeito, desde 8 de diciembre de 1997 a 1 de enero (con anterioridad se observó en la vecina laguna de Caque, término municipal de

Castro de Rei, del 17 al 28 de noviembre de 1997) (L.J. Salaverri Leiras y G. Martínez Lamas).

1997:

Lugo. Véase arriba.

(Norteamérica). Como en la especie anterior, cabe también pensar en un mismo individuo que regresa a Cospeito, donde el invierno 1996-1997 hubo igualmente observaciones entre diciembre y enero (*Ardeola*, 46: 134).

Cerceta Aliazul

Anas discors (PB: 17/19, 1/1; C: 4/6, 0/0)

Almería. Roquetas de Mar, salinas, hembra, 11 a 14 de diciembre (M. Newell).

1997:

Lleida. Torres de Segre, embalse de Utxesa, macho, 26 de diciembre (L. Majorel).

1996:

Girona. Corrección: la cita referente a los Aiguamolls del'Empordà publicada en *Ardeola*, 46: 134, corresponde a B. Minobis y otros.

(Norteamérica). Las primeras citas homologadas de esta especie en España son sólo de 1987, pero desde entonces se ha visto prácticamente cada año.

Porrón Acollarado

Aythya collaris (PB: 8/16, 1/3; C: 15/21, 2/2)

A Coruña. Embalse de Cecebre, tres –un macho y dos hembras–, 15 de febrero (A.A. Pombo Eirín y J. Varela Varela).

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Los Silos, hembra, hay fotografía, del 1 de noviembre (E. García del Rey) hasta el 27 de febrero de 1999 (J.J. Ramos, D. Trujillo, B. Rodríguez y C. González); Adeje, embalse de Curbelo, hembra, hay fotografía, 10 de noviembre a 9 de enero de 1999 (K. Emmerson Shirley y J.A. Lorenzo Gutiérrez; E. García del Rey).

(Norteamérica). Observado cada año desde 1986, su espectro fenológico es típicamente invernal, con inmensa mayoría de observaciones entre noviembre y marzo. Los portugueses han homologado ahora sus dos primeros registros, uno para el continente –macho en S. Jacinto, Aveiro, en diciembre de 1997 y enero de 1998– y otro para las Azores –macho en la isla de Flores el 23 de agosto de 1998 (Costa *et al.*, en prensa).

Serreta Chica

Mergellus albellus (PB: 16/26, 0/0)

1997:

León. Lago de Carucedo, hembra, 2 de marzo (J. García Fernández y E. Álvarez Durango).

(Paleártico boreal). Tercera cita de 1997 y primera para Castilla y León.

Malvasía Canela

Oxyura jamaicensis (PB: 19/40, 0/0)

1997:

Cádiz. Jerez de la Frontera, laguna de Medina, macho, 17 a 23 de febrero (según referencias, el ave se habría visto desde enero y habría sido eliminada el 11 de marzo dentro del programa de protección de la Malvasía Cabeciblanca) (J.A. Doña Palomino).

(América, introducida en Gran Bretaña).

Aguilucho Papialbo

Circus macrourus (PB: 2/2, 1/1; C: 1/1, 0/0)

Girona. Parque natural del Cap de Creus, cerca del monasterio de Sant Pere de Rodes, macho ad., 25 de marzo (X. Parellada i Viladoms).

(Eurasia, desde Rumanía hasta Asia central). Es la primera cita homologada para la Península, frente a dos que llevábamos de Baleares y una de Canarias. Todas las fechas se agolpan entre un 25 de marzo y un 2 de abril.

Busardo Moro

Buteo rufinus (PB: 3/3, 1/1)

Ávila. Urraca Miguel, embalse del Voltoya, probable juv., 5 de septiembre y quizás ya desde 31 de agosto (J.C. Marín González).

(Sureste de Europa, Asia y norte de África). Las características del ejemplar observado podrían atribuirse a la subespecie *rufinus*, de distribución oriental.

Águila Pomerana

Aquila pomarina (PB: 1/1, 0/0)

1997:

Baleares. Isla de Menorca, al noroeste de Ciudadela (Ciudadella), inm., hay fotografías, al menos entre el 10 y el 24 de septiembre (J. Capó Nin y T. Pons).

(Este de Europa y puntos del sur de Asia). Primera cita homologada para las Baleares y el conjunto de España, donde el único precedente lo constituye un ejemplar que se conserva en la Universidad de Sevilla y en cuya etiqueta figuran el año 1889 y “Sevilla” como localidad de captura (Herrera & Hidalgo, 1971). Es muy fácil confundir esta especie con otras de águilas, en particular el Águila Moteada *Aquila clanga* y en este sentido hay que destacar la documentación aportada por los autores al Comité de Rarezas, muy trabajada y meritoria. El Águila Pomerana es una especie muy migradora que tiene sus áreas de cría más próximas en el noreste de Alemania, Polonia y la República Checa, que inverna en África al otro lado del Sahara y que se comporta en el oeste de Europa como divagante comparativamente rara. En Francia, en concreto, se conocen 25 registros hasta 1997 (*Ornithos*, 5: 159), con un aumento reciente que parece estar relacionado con la tendencia al alza en las poblaciones reproductoras (Dubois & Yésou, 1991) y fechas de observación que caen principalmente en abril-mayo y septiembre-octubre. En Marruecos, la Commission d'Homologation Marocaine ha publicado hace no mucho su primer registro: inmaduro o subadulto en Merzouga, Tafilalet, el 18 de abril de 1996 (Bergier *et al.*, 1997).

Halcón Borní

Falco biarmicus (PB: 4/4, 1/1)

Cádiz. Tarifa, juv., 9 de octubre (R. Probst, N. Jankowski y M. Pavlicev).
(Italia, sureste de Europa, África, Arabia y Oriente Medio). **Origen desconocido.** El ejemplar mostraba rasgos correspondientes a la subespecie norteafricana *F. b. erlangeri*. Hay otra cita homologada para la provincia de Cádiz, también de octubre (*Ardeola*, 43:109).

Chorlito Dorado Americano

Pluvialis dominica (PB: 9/9, 0/0; C: 7/7, 2/2)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, El Fraile, juv., hay fotografía, 11 a 14 de noviembre (E. García del Rey); isla de Tenerife, lago Abama, Guía de Isora, juv., hay fotografía, 12 de noviembre (E. García del Rey).

(Norteamérica septentrional). Gracias a estos dos nuevos registros de Tenerife el total para las Canarias iguala, por primera vez, al de la Península.

Chorlito Dorado Americano / Siberiano

Pluvialis dominica / fulva (PB: 3/3, 2/2, C: 2/2, 0/0)

A Coruña. Valdoviño, playa de A Frouxeira, 4 de octubre (K. de Dios Ruiz y X. Prieto).

Huesca. Fraga, arrozales de Fondo de Llitera, juv., 17 de octubre (S. West).
(Norteamérica/Siberia).

Avefría Sociable

Vanellus gregarius (PB: 9/9, 2/2; C: 1/1, 0/0)

Lleida. Bellvís, 24 y 25 de octubre (F. Moncasí i Salvia).

Zaragoza. Alera, hay fotografías, 14 y 15 de marzo (L. Almingol Muñoz y otros).

(Sureste de Rusia y Asia centro-occidental). Dos nuevas citas para el valle del Ebro, en fechas típicas. En la misma localidad de Lleida y por el mismo observador se anotó otro ejemplar en 1997. En Portugal acaban de homologar sus registros segundo y tercero, correspondientes a aves vistas respectivamente en la ría de Alvor (Faro), diciembre de 1997, y en el estuario del Tajo (Santarém), febrero de 1998 (Costa *et al.*, en prensa).

Correlimos Culiblanco

Calidris fuscicollis (PB: 10/10, 1/1; C: 6/6, 0/0)

A Coruña. Laxe, laguna de Traba, ad. en muda, 29 de septiembre (J.L. Rabuñal Patiño).

(Norteamérica septentrional). No teníamos citas gallegas para esta especie desde 1991.

Correlimos Pectoral

Calidris melanotos (PB: 77/85, 1/1; C: 12/12, 0/0)

Navarra. Laguna de Pitillas, 15 de abril (G. Gorospe Rombouts y D. Bogaert).
1997:

Asturias. Corrección: en la observación de Zeluán, ría de Avilés, publicada en *Ardeola*, 46: 138, faltó señalar las fechas: 21 al 26 de julio (esta misma ave fue

grabada en vídeo el día 22 de julio; D.J. Calzada Ledesma y R. Fernández Martínez).

Tarragona. Delta del Ebro, laguna de l'Encanyissada, 25 de septiembre (A. Martínez Vilalta y R. Aymí).

(Norteamérica). El año 1997, ahora con 10 registros homologados, bate todas las marcas.

Correlimos Canelo

Tryngites subruficollis (PB: 14/15, 2/2; C: 3/3, 1/1)

A Coruña. Valdoviño, playa de A Frouxeira, juv. en muda, hay fotografías, 8 a 18 de octubre (Sterna-Ferrol).

Cádiz. Tarifa, playa, hay fotografías, 6 de octubre (G. van Duin).

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, El Fraile, juv., hay fotografía, al menos entre 18 de septiembre y 23 de octubre (M.B. Lancaster; E. García del Rey; K. Emmerson Shirley).

(Norteamérica). Todas las citas hasta el momento son de septiembre-octubre.

Agujeta Escolopácea

Limnodromus scolopaceus (PB: 6/6, 2/2)

Barcelona. Delta del Llobregat, marisma de Les Filipines, 1er. inv., hay fotografías, 25 de octubre a 23 de noviembre (R. Gutiérrez, F. López Sanz, F.X. Santaefemia y otros; D. González Ballvey).

Palencia. Fuentes de Nava, laguna de La Nava, 21 a 23 de abril (E. Gómez Crespo, GESNATUR/Junta de Castilla y León).

(Noreste de Siberia y extremo noroeste de Norteamérica). Aquí tenemos las primeras citas homologadas de Cataluña y de Castilla. Por fechas, llevamos seis otoñales y dos primaverales. La segunda observación homologada en Portugal ha tenido lugar en la Lagoa dos Patos, Beja, en noviembre y diciembre de 1997 (C.C. Moore *in Costa et al.*, en prensa).

Archibebe Patigualdo Grande

Tringa melanoleuca (PB: 2/2, 1/1; C: 1/1, 0/0)

A Coruña. Carballo, marismas de Baldaio, 22 de marzo (A.A. Pombo Eirín).

(Norteamérica). Interesante fecha primaveral. La mayor parte de las presentaciones en Europa tienen lugar en otoño; por ejemplo, para Gran Bretaña e Irlanda Dymond *et al.* (1989) dan tres citas de marzo-mayo frente a 12 de julio-noviembre.

Archibebe Patigualdo Chico

Tringa flavipes (PB: 19/19, 1/1; C: 2/2, 1/1)

Palencia. Fuentes de Nava, laguna de La Nava, ad., 6 de noviembre (E. Gómez Crespo, GESNATUR/Junta de Castilla y León).

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Los Silos, balsa de riego, juv., hay fotografía, 4 a 11 de octubre (E. García del Rey; M.B. Lancaster; J.J. Ramos).

1997:

Asturias. Zeluán, Avilés, hay grabación de vídeo, 22 de julio (D.J. Calzada Ledesma y R. Fernández Martínez).

1996:

Tarragona. Delta del Ebro, cerca de la laguna de Canal Vell, en muda a 1er. inv., 1 de noviembre (D. Bigas y J. Romero).

(Norteamérica). Observaciones muy repartidas, todas otoñales.

Págalo Rabero

Stercorarius longicaudus (PB: 20/25, 0/0; C: 2/4, 0/0)

1997:

A Coruña. Mar a 15 millas de la costa, frente al cabo de Estaca de Bares, juv., 10 de agosto (C. Vidal Rodríguez y R. Salvadores Ramos).

(Holártico boreal). En esta especie parece haber muchas observaciones que no se comunican.

Gaviota Pipizcan

Larus pipixcan (PB: 4/4, 0/0; C: 0/0, 1/1)

Las Palmas. Isla de Lanzarote, Teguisse, Costa Teguisse, ad./2º inv., 14 de enero (K. Eischer).

(Norteamérica). Esta es la primera observación para las Canarias. En Marruecos, la primera cita homologada corresponde a la desembocadura del Sus, bastante próxima a Lanzarote: adulto en enero de 1994 (Bergier *et al.*, 1996).

Gaviota de Delaware

Larus delawarensis (PB: 70/143, 2/2; C: 7/9, 1/1)

A Coruña. Muxía, ría de Camariñas-Muxía, estuario del río Grande, ad., 17 de enero (J.L. Rabuñal Patiño).

Santa Cruz de Tenerife. Isla de La Palma, puerto de Tazacorte, 1er. verano, hay fotografías, 3 de mayo a 5 de junio (J.-D. Ludwigs) y probablemente el mismo, ya con plumaje de 2º inv., hay fotografía, el 5 de diciembre (E. García del Rey).

Vizcaya. Ría de Bilbao (El Abra), 2º inv., 27 de marzo (J.M. Pérez de Ana).

(Norteamérica). Son interesantes las observaciones de la isla de La Palma, que parecen documentar un caso de permanencia estival.

Gaviota Groenlandesa

Larus glaucooides (PB: 11/11, 3/3)

A Coruña. A Coruña, ensenada de Riazaor, ave de 1er. o 2º inv., 8 de enero (probablemente el mismo ejemplar que se observó en el puerto deportivo en diciembre de 1997; *Ardeola*, 46: 141) (I. Fernández Otero). Malpica de Bergantiños, 1er. inv., 30 de enero (A.A. Pombo Eirín). Ferrol, playa de San Xurxo, 1er. inv., hay fotografías, 23 y 24 de febrero (P. Pita Criado).

1997:

A Coruña. A Coruña, véase arriba.

(Noreste del Canadá y Groenlandia). Hasta la fecha llevamos ocho observaciones en Galicia, cuatro en Asturias y dos en el País Vasco.

Charrán Real*Sterna maxima* (PB: 8/9, 0/0)**1997:**

Almería. El Ejido, salinas de Cerrillos, ad., 1 de agosto (M. Paracuellos Rodríguez).

(América y costas de África occidental). Aún sin observaciones en Canarias.

Tórtola Senegalesa*Streptopelia senegalensis* (PB: 3/3, 0/0; C: 0/0, 3/4)

Las Palmas. Isla de Fuerteventura, Morro Jable, jardines del hotel “Stella Canaris” dos, 10 y 31 de enero (C.-J. Palacios y M. Nistal); zoo de La Lajita, una, 6 de mayo (C.-J. Palacios y E. Castilla); Parque Holandés, una, 18 de mayo (C.-J. Palacios y A. Palacios).

(África y suroeste de Asia). **Origen desconocido.** Primeras observaciones canarias, que podrían corresponder a aves procedentes de cautividad, si bien la especie ha experimentado una importante expansión sobre el norte de África y nidifica ya en varios puntos de Marruecos, alguno tan inmediato a las Canarias como Massa (Snow & Perrins, 1998).

Búho Moro*Asio capensis* (PB: 0/0, 1/1)

Cádiz. Jerez de la Frontera, marisma de Bolaños (bahía de Cádiz), 1er. inv., se recoge herido por arma de fuego el 10 de diciembre y muere tres días más tarde en el Centro de Recuperación del Zoo de Jerez, se conserva en piel en la Universidad Marcelo Spínola, Umbrete (Sevilla), hay fotografías (I. Sánchez García; I. Fajardo).

(Marruecos y otras partes de África al sur del Sahara). Una lástima, sin duda, que nuestra primera cita homologada, la única en este siglo en Europa, tenga que ver con un ave muerta a tiros... De acuerdo con la necropsia practicada, el ejemplar sería una hembra inmadura cuyos rasgos se corresponden con los de la subespecie *A. c. tingitanus*, la que cría en Marruecos (Sánchez García, 1999). A fines del siglo XIX citó Irby al Búho Moro junto a la antigua laguna de La Janda, donde en una pequeña zona próxima a Benalup de Sidonia (antes Casas Viejas) se vieron o cazaron hasta 9 aves distintas entre octubre-noviembre de 1868, noviembre de 1870 y diciembre de 1873 (Irby, 1895). Además, Saunders (1871) señala una captura cerca de Utrera (Sevilla) en noviembre de 1867 y Tait (1924) habla de otra en Pancas, estuario del Tajo (Portugal), efectuada por el rey Don Carlos de Braganza. Estas observaciones antiguas, que parecen señalar una presencia regular de la especie en el sur de Iberia, corresponden sin duda a una situación demográfica de las poblaciones marroquíes mucho más boyante que la actual: se estima que quedan sólo de 50 a 140 parejas, muy localizadas (Snow & Perrins, 1998) y en 1998 un censo en la Merdja Zerga arrojó como mínimo 15 parejas (*British Birds*, 92: 75).

Vencejo Moro*Apus affinis* (PB:14/25, 1/1; C: 3/3, 1/1)

Cádiz. Sotogrande, estuario del río Guadiaro, 13 de mayo (J. Butler).

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Granadilla de Abona, presa de La Barca, 7 y 11 de mayo (K. Emmerson Shirley).

1997:

Sevilla. Constantina, 3 de julio (F. Chiclana Moreno).

(África, Oriente Medio y sur de Asia). Todos nuestros registros caen entre enero y julio, con mayoría en mayo-junio.

Terrera Colinegra

Ammomanes cincturus (PB: 1/1, 0/0; C: 1/1, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de La Gomera, cerca de la playa de Avalo, junto a San Sebastián de La Gomera, hay fotografía, 27 de febrero (R. Simonsson y A.-L. Nyberg).

(Sahara, Arabia, Oriente Medio, Irán y Paquistán). Segunda cita que se homologa para las Canarias, tras la de Santa Cruz de Tenerife en marzo de 1990 (*Ardeola*, 41: 113). Además, hay una en Mallorca de marzo de 1994 (*Ardeola*, 43: 144-115).

Alondra Ibis

Alaemon alaudipes (C: 2/2, 0/0)

1988:

Las Palmas. Isla de Lanzarote, área entre Puerto del Carmen y Femés, 22 de enero (M.M. Hansen).

(Norte de África y sureste de Asia). Registro ya antiguo que sería, cronológicamente, el primero homologado para la especie en Canarias y el conjunto de España (véanse *Ardeola*, 46: 141-142 y *La Garcilla*, 104: 25).

Bisbita de Richard

Anthus richardi (PB: 40/127, 2/12; C:2/2, 0/0)

A Coruña. Laxe, laguna de Traba, cuatro, todos de 1er. inv., 29 de noviembre de 1997 a 26 de abril de 1998 (cuatro individuos se observaron únicamente los días 8 y 21 de marzo; antes hubo dos el 14 de diciembre y tres el 1 de marzo, y todavía tres el 19 de abril) (J.L. Rabuñal Patiño).

Almería. Parque Natural de Cabo de Gata, reserva de Las Amoladeras, ocho, atrapados para anillamiento, hay fotografías, 17 de enero a 14 de marzo (otras fechas de anillamiento: 24 de enero; 7, 8, 22 y 28 de febrero; 1 de marzo) (J. Manrique Rodríguez y otros).

1997:

A Coruña. Ribeira, lagunas de Carregal y Montevixán, un ave el 15 de noviembre (A.A. Pombo Eirín) y dos el 30 de noviembre (J.M. Martínez Mariño).

(Centro y este de Asia). De especial interés es la información referente a la reserva ornitológica de Las Amoladeras, en Almería, donde además de las aves anilladas se vieron regularmente otras -no homologadas en ausencia de descripción- hasta un máximo de 18 individuos el día 28 de febrero. Otros casos de invernada se han detectado últimamente en Francia y Marruecos (*British Birds*, 92: 76 y 293).

Coliazul Cejiblanco*Tarsiger cyanurus* (PB: 0/0, 1/1)

Barcelona. Delta del Llobregat, marisma de Les Filipines, hembra o 1er. inv., capturada para anillamiento, hay fotografías, 17 de noviembre (S. Sales, F.X. Santaefemia, R. Gutiérrez, F. López y otros).

(Noreste de Europa y Asia, desde Finlandia hasta el Japón y la cordillera del Himalaya). Primera cita para España y la península Ibérica de este precioso túrdido. Dejando fuera Finlandia y Rusia, donde cría en pequeño número, no llegan a 50 los registros en Europa, si bien parecen presentar una tendencia al alza en correspondencia con una lenta expansión del área de cría hacia el oeste (en Finlandia se detectó por primera vez un macho cantor en 1949 y ahora ya se han visto varios en Suecia) (Lewington *et al.*, 1991; Mitchell & Young, 1997; van den Berg & Bosman, 1999). En Francia tan sólo hay una cita homologada, de 1993 (*Ornithos*, 2: 13). La mayor parte de los registros europeos son otoñales y más concretamente de septiembre-octubre, aunque hay varios de noviembre e incluso uno, italiano, de principios de diciembre.

Tarabilla Común*Saxicola torquata* (PB: 3/3, 1/1)

Ejemplar con caracteres de las subespecies *Saxicola torquata maura/stejnegeri*:

Barcelona. Barcelona, parque de Collserola, macho, 30 y 31 de marzo (A. Rajasärkkä).

(Norte y este de Rusia, y Siberia). Las tres observaciones homologadas previas corresponden a 1997 (*Ardeola*, 46: 143).

Carricero Agrícola*Acrocephalus agricola* (PB: 4/4, 0/0)**1997:**

Sevilla. La Puebla del Río, La Marmoleja, 1er. inv., capturado para anillamiento, hay fotografías, 25 de enero (J.A. Cabral Herrera y M. Vázquez Castro /Estación Biológica de Doñana).

Tarragona. Delta del Ebro, laguna de Canal Vell, capturado para anillamiento, hay fotografías, 2 de noviembre (J.M. Arcos).

(Asia, con pequeñas poblaciones en Bulgaria y Rumanía). Las dos observaciones anteriores corresponden también, curiosamente, a las provincias de Tarragona y Sevilla (*La Garcilla*, 100: 26-27). Destaca este año la fecha sevillana, plenamente invernal. El Comité Portugués de Raridades ha homologado hace poco la tercera cita portuguesa: Aveiro, 11 de febrero de 1998 (J. Neto *in* Costa *et al.*, en prensa).

Curruca Carrasqueña*Sylvia cantillans* (PB: 1/1, 0/0)

Individuo con caracteres de la subespecie *Sylvia cantillans albistriata*:

1997:

Baleares. Isla de Menorca, Sant Lluís, islote Illa de l'Aire, macho, atrapado para anillamiento, hay fotografía, 2 de abril (O. García Febrero, S. Cachot y R. Escandell).

(Balcanes y Asia Menor). Es la primera vez que se señala en España, que sepamos, la subespecie oriental de la Curruca Carrasqueña, que cría a partir de Eslovenia e inverna en África entre Mali y Sudán. En migración sería regular por el oeste hasta el noreste de Argelia, aunque algunas aves se ha citado como divagantes en las islas Británicas y en Bélgica (Cramp, 1992).

Mosquitero Bilistado

Phylloscopus inornatus (PB: 16/16, 1/1; C: 5/5, 0/0)

Barcelona. Delta del Llobregat, marisma de Les Filipines, atrapado para anillamiento, hay fotografías, 16 de noviembre (S. Sales, A. Ramal, F. López, R. Gutiérrez, J. Bach y otros).

(Norte y este de Siberia y Asia central). Conviene, en observaciones de esta especie, prestar atención a la posibilidad del muy parecido *Phylloscopus humei* (en Francia se han homologado ya cinco citas; *Ornithos*, 5: 39).

Papamoscas Papirrojo

Ficedula parva (PB: 11/11, 1/1; C: 1/1, 0/0)

Baleares. Isla de Cabrera, hembra ad., atrapada para anillamiento, hay fotografías, 29 de septiembre (J.M. González Mulet y O. Clarabuch i Vicent).

1997:

Alicante. El Hondo, macho ad., atrapado para anillamiento, hay fotografía, 18 de octubre (G. López Iborra).

1996:

Baleares. Isla de Menorca, Sant Lluís, islote Illa de l'Aire, hembra, atrapada para anillamiento, hay fotografía, 15 de mayo (O. García Febrero y J.C. Fernández Ordóñez).

(Europa central y oriental, y Asia). La cita de Menorca, en 1996, es la primera que tenemos con fecha primaveral; las demás caen todas entre un 14 de septiembre y un 1 de noviembre.

Papamoscas Collarino

Ficedula albicollis (PB: 23/23, 0/0)

1997:

Baleares. Isla de Menorca, Sant Lluís, islote Illa de l'Aire, hembra ad., atrapada para anillamiento, hay fotografía, 19 de abril (O. García Febrero).

1996:

Baleares. Isla de Menorca, Sant Lluís, islote Illa de l'Aire, macho, atrapado para anillamiento, hay fotografía, 7 de abril (O. García Febrero).

(Europa central y oriental y partes de Turquía, el Cáucaso e Irán). Llevamos ya 16 citas en las Baleares frente a 6 en Cataluña y 1 en Andalucía.

Alcaudón Isabel

Lanius isabellinus (PB: 2/2, 0/0)

1997:

A Coruña. Mañón, cabo de Estaca de Bares, 1er. inv., 12 a 16 de septiembre (A. Sandoval Rey y K. Duus).

1994:

Baleares. Isla de Mallorca, salinas de Salobrar de Campos, macho ad., 9 de septiembre (N.F. Willis y M.S. Rolfe).

(Asia). Primeros registros homologados en España, uno balear y otro peninsular. En Europa esta especie es divagante comparativamente rara, con mayoría de datos atribuibles a la subespecie *phoenicuroides*, la más occidental, que se extiende en época de cría desde Irán y Kazajastán hasta el Tien Shan, e inverna principalmente en África oriental y el sur de Arabia. Por lo menos el ave de las Baleares presentaba las características de esta raza. Se conocen ya unos 80 registros europeos –aproximadamente la mitad en las islas Británicas- que caen sobre todo entre septiembre y noviembre (Lewington *et al.*, 1991; Mitchell & Young, 1997). En Francia llevan 6 hasta 1997 (*Ornithos*, 5: 174).

Alcaudón Común

Lanius senator (PB: 2/2, 0/0)

Individuo que presenta caracteres de la raza *Lanius senator niloticus*:

1995:

Castellón. Islas Columbretes, macho, atrapado para anillamiento, hubo fotografías posteriormente extraviadas, 21 y 23 de abril (D. Bigas, J.C. García, C. Lozano y E. Simó).

(Desde Chipre, Palestina y Asia Menor hasta Irán). Segundo registro en España de esta subespecie oriental, siendo la anterior de Menorca, año 1992, también durante el mes de abril (*Ardeola*, 41: 114-115).

Camachuelo Carminoso

Carpodacus erythrinus (PB: 17/17, 1/1)

Baleares. Isla de Cabrera, 1er. inv., hay fotografías, 17 de septiembre (J.M. González Mulet y O. Clarabuch i Vicent).

1996:

Baleares. Isla de Menorca, Sant Lluís, islote Illa de l'Aire, hembra o 1er. inv., atrapado para anillamiento, hay fotografía, 28 de abril (O. García Febrero).

(Norte y centro de Europa, y Asia). La cita de Menorca es primaveral: con ella tenemos ahora dos en el período abril-mayo frente a 16 en septiembre-noviembre, patrón muy similar a los que se aprecian en Francia (Dubois & Yésou, 1991) y las islas Británicas (Dymond *et al.*, 1989).

Escribano Pigmeo

Emberiza pusilla (PB: 14/14, 3/3)

A Coruña. Laxe, laguna de Traba, 1 y 8 de marzo (J.L. Rabuñal Patiño).

Baleares. Isla de Formentera, La Mola, 1er. inv., atrapado para anillamiento, hay fotografías, 10 de octubre (S. Costa Juan).

Burgos. Burgos, parque de La Quinta, hay fotografía, 13 de abril (T. Robinson).

(Nordeste de Europa y Siberia). Se incluyen esta vez, por excepción, dos citas primaverales y que no corresponden a aves anilladas.

Escribano Cabecinegro*Emberiza melanocephala* (PB: 6/6, 1/1)**Baleares.** Isla de Mallorca, Pollensa (Pollença), valle de Bóquer, macho, 11 de mayo (P. Morrison y S. Morrison).**1997:****Tarragona.** Delta del Ebro, dunas junto a la gola de Pal, macho, 27 de mayo (D. Bigas, J.M. Arcos y A. Martínez-Vilalta).**1996:****Baleares.** Isla de Mallorca, parque natural de s'Albufera, macho, 5 de mayo (H. Franklin y otros/Banbury Ornithological Society).

(Italia, sureste de Europa y Asia hasta el Irán). Esta especie es frecuente en cautividad pero el patrón geográfico de las observaciones –todas en el litoral mediterráneo– sugiere decididamente un origen natural. En este informe, además, todas las citas son de mayo, mes en el que tiene lugar el grueso de la migración prenupcial.

2) ESPECIES CONSIDERADAS RAREZAS SÓLO PARA LAS ISLAS CANARIAS**Avetoro Común***Botaurus stellaris* (0/0, 1/1)**Las Palmas.** Isla de Lanzarote, Teguise, Costa Teguise, hay fotografía, 14 de marzo (F. Ascanio y A. Rodríguez, comunicado por J.A. Lorenzo Gutiérrez).

(Eurasia y puntos de África). Primer registro homologado para las Canarias, aunque hay algunos previos que el Comité estudiará en breve.

Polluela Chica*Porzana pusilla* (1/1, 0/0)**1997:****Santa Cruz de Tenerife.** Isla de Tenerife, La Laguna, Tejina, determinación mediante una fotografía (posteriormente extraviada), 5 a 15 de marzo (E. García del Rey y D.L. Sánchez).

(Eurasia, África, Madagascar, Nueva Guinea, Australia y Nueva Zelanda). El individuo en cuestión estaba acompañado por Polluela Pintoja (*Porzana porzana*) y Polluela Bastarda (*Porzana parva*). De esta especie hay datos previos que el Comité estudiará en breve.

Archibebe Fino*Tringa stagnatilis* (0/0, 1/1)**Las Palmas.** Isla de Fuerteventura, Antigua, barranco de La Torre, 7 de diciembre (C.-J. Palacios).

(Europa oriental y sur de Siberia). Primer registro homologado para las Canarias, de fecha invernal.

Gaviota Cabecinegra*Larus melanocephalus* (1/1, 0/0)**1997:**

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Puerto de la Cruz, 1er. inv., hay fotografías, 10 a 22 de noviembre (D. Trujillo González y C. González González). (Europa, Turquía y el Cáucaso). A las islas debe llegar con cierta regularidad, en especial en invierno y sobre todo a base de juveniles e inmaduros, pero la información existente es escasa.

Gaviota de Sabine*Larus sabini* (0/0, 1/1)

Las Palmas. Isla de Gran Canaria, unos 10-15 km mar afuera del puerto de Las Palmas de Gran Canaria en dirección a Tenerife, 1er. verano, 29 de abril (D. Trujillo González).

(Holártico circumpolar). Primer dato homologado para Canarias aunque hay otras citas, alguna incluso de aves colectadas, que el Comité de Rarezas estudiará próximamente. Suelen corresponder a épocas de paso (primavera y otoño).

Charrán Ártico*Sterna paradisaea* (0/0, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Adeje, presa de Curbelo, ad., 2 de mayo (K. Emmerson Shirley).

(Holártico circumpolar). Ha podido pasar desapercibido en Canarias donde cabría esperar que llegara con cierta regularidad en paso.

Grajilla*Corvus monedula* (0/0, 1/1)

Santa Cruz de Tenerife. Isla de Tenerife, Guía de Isora, Callao Chico-Punta Blanca, 10 de enero (R. Barone).

(Europa y oeste de Asia; Berbería). Sólo se conoce otra cita canaria, del siglo XIX (ave colectada en La Laguna, Tenerife, en 1830, tras fuertes vientos del sureste).

LISTA DE REGISTROS NO HOMOLOGADOS

1994:

Ánsar Piquicorto *Anser brachyrhynchus*; parque natural de los Aiguamolls de l'Empordà (Girona), 18 de enero a 20 de marzo (descripción excesivamente superficial). **Águila Pomerana** *Aquila pomarina*; delta del Llobregat (Barcelona), 14 de septiembre (la descripción no excluye la posibilidad de otras especies de águilas como *Aquila clanga*, *A. rapax* o *A. nipalensis*).

1995:

Carricero Políglota *Acrocephalus palustris*; Albufera de Valencia (Valencia), capturado para anillamiento, 8 de septiembre (no es posible, a partir de la

descripción y los datos biométricos recibidos, descartar *Acrocephalus scirpaceus* con total seguridad). **Mosquitero Común** *Phylloscopus collybita tristis*; Villadangos del Páramo (León), hay fotografías, 19 de noviembre (descripción y fotografías apuntan más bien hacia la subespecie *abietinus*).

1996:

Busardo Moro *Buteo rufinus*; Timijiraque, Valverde, isla del Hierro (Santa Cruz de Tenerife), 17 de septiembre (descripción insuficiente); campos entre El Hondo y Santa Pola (Alicante), juv., hay fotografías, 9 de diciembre (fotografías y descripción no permiten descartar del todo la posibilidad de *Buteo buteo* –entre otras cosas el ave sólo se observó posada). **Correlimos Falcinelo** *Limicola falcinellus*; El Garxal, delta del Ebro (Tarragona), ad., 24 de julio (descripción con rasgos que no se corresponden con la especie propuesta). **Andarríos Maculado** *Actitis macularia*; salinas de Fuencaliente, isla de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), 1er. inv., hay fotografía, 17 de octubre (no queda del todo claro que no pudiera tratarse de *Actitis hypoleucos*). **Gaviota de Bonaparte** *Larus philadelphia*; Arriluce, Getxo (Vizcaya), 10 de febrero (la descripción aportada no permite plena seguridad). **Carricero Políglota** *Acrocephalus palustris*; Vélez-Málaga (Málaga), capturado para anillamiento, hay fotografías, 29 de septiembre (podría tratarse de *Acrocephalus scirpaceus*). **Mosquitero Común** *Phylloscopus collybita tristis*; islote Illa de l'Aire, Menorca (Balears), atrapado para anillamiento, 30 de abril (falta una descripción del ave). **Escribano de Pallas** *Emberiza pallasi*; delta del Llobregat (Barcelona), hembra, 10 de abril (observación breve que no permite registrar todos los caracteres necesarios para determinar con plena seguridad esta especie, de identificación delicada y nunca antes citada en España).

1997:

Zampullín Cuellirrojo *Podiceps auritus*; embalse de Santa Teresa, La Maya (Salamanca), 18 de enero (descripción insuficiente). **Cerceta Aliazul** *Anas discors*; embalse de Valle Molina, isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), hembra, hay fotografía, 12 a 15 de octubre (ni la descripción ni la fotografía permiten asegurar la identidad de la especie). **Aguilucho Papialbo** *Circus macrourus*; Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), macho, 20 de septiembre (descripción insuficiente). **Busardo Moro** *Buteo rufinus*; Algeciras (Cádiz), 2 de octubre (la descripción apunta a esta especie pero no permite descartar *Buteo buteo vulpinus*). **Águila Moteada** *Aquila clanga*; entre Osso y Belver (Huesca), 7 de marzo (inseguridad del observador y descripción insuficiente); Puig de Biniarroga, Maó, isla de Menorca (Balears), 24 de marzo (descripción insuficiente). **Correlimos Canelo** *Tryngites subruficollis*; laguna de Traba, Laxe (A Coruña), 22 de septiembre (algunos de los rasgos señalados no coinciden con la especie propuesta). **Gaviota de Delaware** *Larus delawarensis*; Vigo (Pontevedra), 3er. inv., 25 de noviembre y otras fechas hasta el 5 de febrero de 1998 (descripción insuficiente). **Charrán Ártico** *Sterna paradisaea*; “ferry” entre las islas de Tenerife y Gran Canaria (Santa Cruz de Tenerife/Las Palmas), 16 aves, 24 de septiembre (descripción insuficiente). **Vencejo de Chimenea** *Chaetura pelagica*; parque de TenBel, isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), 2 de octubre, 26 de noviembre y 4 y 19 de diciembre (descripción insuficiente).

1998:

Tarro Canelo *Tadorna ferruginea*; embalse de Los Canchales, Mérida (Badajoz), cinco, 11 de septiembre (descripción insuficiente). **Porrón Islándico** *Bucephala islandica*; Arriluce, Getxo (Vizcaya), hembra de 1er. inv., 12 a 17 de marzo

(algunos rasgos, observables también en las fotografías disponibles, se ajustan a *Bucephala clangula*). **Aguilucho Papialbo** *Circus macrourus*; Sástago (Zaragoza), macho, 24 de mayo (descripción insuficiente). **Busardo Ratonero** *Buteo buteo vulpinus*; El Algarrobo, Algeciras (Cádiz), 6 y 12 de octubre (descripción insuficiente). **Busardo Moro** *Buteo rufinus*; Peralta de Alcofea (Huesca), 15 de marzo (descripción insuficiente). **Busardo Calzado** *Buteo lagopus*; Santa Coloma de Queralt (Tarragona), 25 de abril (información insuficiente para descartar *Buteo buteo*). **Águila Pomerana** *Aquila pomarina*; entre Algeciras y Tarifa (Cádiz), hay fotografías, 5 de septiembre a 2 de octubre (un ave, con el plumaje muy estropeado, que vieron numerosos observadores participantes en el control de migración de rapaces a través del Estrecho, pero que a la vista de las descripciones y fotos recibidas no parece posible asignar con absoluta seguridad a la especie propuesta). **Águila Moteada** *Aquila clanga*; sierra del Cambrón, Mula (Murcia), 19 de marzo (descripción insuficiente); Loiu (Vizcaya), 21 de septiembre (descripción insuficiente); salinas de Santa Pola (Alicante), juv., 27 de septiembre (descripción insuficiente). **Halcón Borní** *Falco biarmicus*; Tarifa (Cádiz), 5 de septiembre (la descripción, muy breve, no permite descartar otras especies de halcones). **Gaviota Pipizcan** *Larus pipixcan*; L'Estartit (Girona), 21 de junio (la descripción no se ajusta a la especie propuesta). **Gaviota de Delaware** *Larus delawarensis*; Vigo (Pontevedra), dos, un 3er. inv. visto en diversas ocasiones entre el 25 de noviembre de 1997 y el 5 de febrero (véase arriba) y un 2º inv. el 27 de enero (descripción insuficiente); playa de La Caleta, Cádiz (Cádiz), 26 de noviembre (descripción muy breve y que en algunos rasgos se aleja de la especie considerada). **Gaviota Groenlandesa** *Larus glaucooides*; Moaña, ría de Vigo (Pontevedra), 2º inv., 19 y 27 de enero (descripción insuficiente). **Gaviota Rosada** *Rhodostethia rosea*; delta del Ebro (Tarragona), 11 de abril (parece segura una confusión con otra especie de gaviota). **Autillo Europeo** *Otus scops*; Pájara, isla de Fuerteventura (Las Palmas), 2 de abril (descripción insuficiente). **Lavandera Cetrina** *Motacilla citreola*; Auta, Riogordo (Málaga), capturada para anillamiento, hay fotografías, 25 de septiembre (las fotografías muestran que el ave es una Lavandera Boyera *Motacilla flava*). **Tarabilla Común** *Saxicola torquata maura/armenica*; Torredembarra (Tarragona), macho, 14 de febrero (la descripción no permite asignar el ave a ese conjunto de subespecies). **Mosquitero Común** *Phylloscopus collybita tristis*; embalse de La Viñuela, Periana (Málaga), atrapado para anillamiento, hay fotografías, 27 de octubre (ni la descripción ni las fotografías se ajustan a la subespecie propuesta).

BIBLIOGRAFÍA

- BERGIER, P., FRANCHIMONT, J., SCHOLLAERT, V., THEVENOT, M. et la Commission d'Homologation Marocaine. 1996. Les Oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine Numéro 1. *Porphyrio*, 8: 151-158.
- BERGIER, P., FRANCHIMONT, J., THEVENOT, M. et la Commission d'Homologation Marocaine. 1997. Les Oiseaux rares au Maroc. Rapport de la Commission d'Homologation Marocaine Numéro 2 (1996). *Porphyrio*, 9: 165-173.

- BERNIS, F. 1966. *Aves Migradoras Ibéricas*, fascículo 2. Sociedad Española de Ornitología. Madrid.
- CASTROVIEJO, J. 1972. Première capture du *Dendrocygne fauve* *Dendrocygna bicolor* dans la péninsule Ibérique. *Alauda*, 40: 287.
- COSTA, H., BOLTON, M., CATRY, P., MATIAS, R., MOORE, C.C. & TOMÉ, R. (en prensa). Aves de ocorrência rara ou acidental em Portugal. Relatório do Comité Português de Raridades referente aos anos de 1997 y 1998. *Pardela*, 9.
- COTTRIDGE, D.M. & VINICOMBE, K. 1996. *Rare Birds in Britain and Ireland. A Photographic Record*. HarperCollins Publishers. London.
- CRAMP, S. (ed.) 1992. *The Birds of the Western Palearctic*, vol. 6. Oxford University Press. Oxford.
- DUBOIS, P.J. & YÉSOU, P. 1991. *Les Oiseaux Rares en France*. Raymond Chabaud. Bayonne.
- DYMOND, J.N., FRASER, P.A. & GANTLETT, S.J.M. 1989. *Rare Birds in Britain and Ireland*. T & AD Poyser. Calton.
- GARCÍA, L., CALDERÓN, J. & CASTROVIEJO, J. 1989. *Las aves de Doñana y su entorno*. Estación Biológica de Doñana. Sevilla.
- HERRERA, C. & HIDALGO, J. 1971. Sobre un antiguo ejemplar de *Aquila pomarina* en Andalucía. *Ardeola*, 15: 133-134.
- HIDALGO, J. & RODRÍGUEZ, P. 1972. Captura de un *Anser erythropus* en las marismas del Guadalquivir. *Ardeola*, 16: 254.
- IRBY, L.H. 1985. *The Ornithology of the Straits of Gibraltar*, 2nd. ed. Taylor and Francis. London.
- LEWINGTON, I; ALLSTRÖM, P. & COLSTON, P. 1991. *A Field Guide to the Rare Birds of Britain and Europe*. HarperCollins Publishers. London.
- LLANDRES, C. & URDIALES, C. 1990. *Las Aves de Doñana*. Lynx Edicions. Barcelona.
- MITCHELL, D. & YOUNG, S. 1997. *Photographic Handbook of the Birds of Britain and Europe*. New Holland. London.
- PERSSON, H. 1995. Invernada de ánsares en España. *Quercus*, 109: 19-22.
- ROGERS, M.J. and the Rarities Committee. 1999. Report on rare birds in Great Britain in 1998. *British Birds*, 92: 554-609.
- SÁNCHEZ GARCÍA, I. 1999. La lechuza del siglo. *Quercus*, 158: 40.
- SAUNDERS, H. 1871. A list of the birds of Spain. *Ibis*, año 1871: 54-68, 205-225 y 384-402.
- SNOW, D.W. & PERRINS, C.M. (eds.) 1998. *The Birds of the Western Palearctic. Concise Edition*. Oxford University Press. Oxford.
- TAIT, W.C. 1924. *The Birds of Portugal*. H.F. & G. Witherby. Londres.
- TUCKER, G.M. & HEATH, M.F. 1994. *Birds in Europe: their conservation status*. BirdLife International. Cambridge.
- VAN DEN BERG, A.B. & BOSMAN, C.A.W. 1999. *Rare birds of the Netherlands*. Pica Press, Mountfield (Reino Unido).
- VINICOMBE, K. & HARROP, H. 1999. Ruddy Shelducks in Britain and Ireland, 1986-94. *British Birds*, 92: 225-255.